

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Rue Paul-Doumer, 93100 MONTREUIL s/BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

30 F

20 AOUT 1973

BULLETIN N°155  
Supplément n°1

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

#### CULTURES FRUITIÈRES

Le 2<sup>e</sup> vol se poursuit en tous secteurs ; les conditions climatiques sont favorables. Des éclosions larvaires notables se produiront donc au moins jusqu'à la fin du mois. Dans les vergers isolés, où aucune attaque ne s'est produite en 1<sup>ère</sup> génération les dégâts ne semblent pas à craindre.

TAVELURES : Revoir les indications du précédent bulletin.

CARPOCAPSE DES PRUNES : Les éclosions larvaires sensibles ne devraient pas dépasser le 25 août. Elles seront plus faibles ensuite jusque vers le 5-10 septembre.

ACARIENS - PSYLLES : Les acariens sont toujours très actifs dans certains vergers. Les psylles causent parfois de fortes attaques à l'époque de la récolte. Actuellement on trouve surtout des larves en fin d'évolution, des adultes nouvellement éclos et des pontes récentes. Surveiller particulièrement les vergers pour intervenir dès les premières éclosions larvaires si les pontes sont abondantes.

### MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

#### GRANDES CULTURES

La végétation de la plupart des cultures de Bintje, même saines ne justifie plus un traitement. Il va rester à protéger les cultures de Bintje encore bien vertes et les variétés plus tardives (type Ker Pondy ou féculières). Ces dernières, région d'Ablis notamment, sont quelquefois atteintes assez fortement. Jusqu'à ce jour le temps actuel est défavorable au Mildiou. Mais les traitements réalisés avant le 10 août vont arriver en fin d'efficacité. Une pluie déclanchant une humidité élevée pendant une longue durée pourrait entraîner de nouvelles contaminations.

### CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE

Comme prévu de nouvelles taches sont sorties et la situation a légèrement évolué. Dans les cultures non encore traitées, surveiller l'évolution (voir les bordures de champs de betteraves de l'année dernière) pour intervenir à temps. Tenir compte de la date de la récolte

#### CULTURES LEGUMIÈRES

TEIGNE DU POIREAU : Des cocons sont toujours existants. Le vol va se poursuivre. Des éclosions larvaires se produiront au moins jusqu'à la fin du mois, peut-être jusqu'à la mi-septembre. Les traitements contre la teigne sont efficaces contre le Thrips.

MALADIES DE LA TOMATE : Dans le secteur de Montlhéry, aucune attaque n'a été observée. Par contre les premiers dégâts d'*Alternaria* apparaissent. Pour lutter contre cette maladie utiliser : Captafol 80g, Mancozèbe et Manèbe 160g, Propinèbe 210g, de m.a/hl. Ces produits sont actifs contre le Mildiou de la tomate.

L'Ingénieur et le Technicien  
chargés des Avertissements Agricoles  
H. SIMON et R. MERLING

Le Chef de la Circonscription  
de la Région Parisienne,  
R. SARRAZIN. P 316

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX  
47, rue Paul Doumer - 93100 - MONTREUIL.